



LANSOPRAZOL + BROMOPRIDA

Em pacientes com dispepsia funcional e refluxo gastroesofágico.

Medicamento facilita digestão e reduz refluxo

GABRIELA SCHEINBERG
FREE-LANCE PARA A FOLHA

Estima-se que 40% das pessoas que procuram um gastroenterologista apresentam dispepsia funcional. **A dispepsia funcional é freqüentemente associada a outro problema que afeta cerca de 12% da população brasileira, a doença do refluxo gastroesofágico. É para esses pacientes, que sofrem simultaneamente de refluxo e dispepsia, que é indicado o Lansoprid, lançado neste mês.**



O novo medicamento é uma associação de duas drogas que, até agora, só podiam ser administradas separadamente: o lansoprazol (que atua no controle da azia provocada pelo refluxo) e a bromoprida (para dispepsia). **Além de baratear o tratamento em torno de 15%, o remédio facilita a rotina do paciente, pois reduz o número de comprimidos a serem ingeridos.**

O lansoprazol faz parte de uma classe de medicamentos chamada inibidores da bomba de prótons (IBP), que bloqueiam a secreção do ácido clorídrico produzido pelo estômago.

Já a bromoprida age sobre a motilidade do estômago, facilitando a digestão...

Fonte: Folha de São Paulo-SP 31/07/2003

Tratamento da gastrite crônica. Resultados da terapia com o regulador de motilidade – BROMOPRIDA.⁽¹⁾

O resultado terapêutico positivo justificou o uso clínico dessa droga no tratamento do refluxo gastroduodenal, que causa grande desconforto em pacientes com gastrite crônica.

No estudo não foram observados efeitos colaterais.

Fortschr Med. 1980 may 8;98(17):679-82.



A dose diária baixa versus dose alternada alta no tratamento de manutenção do refluxo esofágico.

137 pacientes com refluxo esofágico previamente tratados:

- Grupo I - LANSOPRAZOL, 15mg ao dia;
- Grupo II - LANSOPRAZOL, 30mg em dias alternados.



Nesse estudo comprovou-se a eficácia de ambos tratamentos na prevenção da recorrência da esofagite. **A administração diária apresentou melhores resultados na prevenção dos sintomas de recorrência.**



Am J Gastroenterol. 2002 Jun;97(6):1357-64.

Descrição

- O LANSOPRAZOL é um benzimidazol substituído com uma estrutura semelhante ao omeprazol;
- Pertence à classe dos inibidores da bomba protônica; ⁽³⁾
- A BROMOPRIDA é um procinético gastrointestinal e antiemético, pertencente à classe dos antidopaminérgicos. ^(3,4)

Mecanismo de Ação

- LANSOPRAZOL em pH ácido é transformado para sua forma ativa que reage com os grupos tiólicos da enzima $H^+, K^+ - ATP\text{-ase}$ inibindo-a;
- Essa inibição bloqueia a fase final da secreção do ácido. ⁽³⁾



BROMOPRIDA

- Antidopaminérgico;
- Apresenta ação normalizadora da motricidade do estômago, duodeno e jejuno;
- Reconduz o tônus e a peristalse aos padrões fisiológicos. ^(3,4)

Propriedades Farmacológicas

LANSOPRAZOL ^(3,4)	BROMOPRIDA ^(3,4)
Diminui a secreção gástrica do ácido clorídrico	Normaliza a motricidade do estômago, duodeno e jejuno.
Promove o alívio sintomático da esofagite de refluxo	Possui ação antiemética, atuando em nível central e periférico.
	Normaliza o esvaziamento incompleto ou tardio das vias biliares.

Estas informações devem ser analisadas pelo profissional prescriptor antes de adotadas na clínica, e são de distribuição e uso exclusivo de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários devidamente inscritos em seus C.R.s.

GV – Consultoria Farmacêutica

www.consultoriafarmaceutica.com.br



Indicação ⁽⁵⁾

- Dispepsia funcional associada à doença do refluxo gastroesofágico.

Posologia ⁽⁶⁾

	LANSOPRAZOL	BROMOPRIDA
Manhã	15 a 30 mg	10mg
Tarde	-	10mg
Noite	-	10mg

As doses devem ser ingeridas 20 a 30 minutos antes das refeições.

Sugestão de Fórmulas

1. Tratamento da dispepsia funcional associada à doença do refluxo gastroesofágico

Cápsulas de LANSOPRAZOL

Lansoprazol	15mg	- Inibidor da bomba protônica.
-------------	------	--------------------------------

Mande (x) cápsulas.

Tomar 1 cápsula pela manhã.

Cápsulas de BROMOPRIDA

Bromoprida	10mg	- Procinético.
------------	------	----------------

Mande (x) cápsulas.

Tomar 1 cápsula 20 a 30 minutos antes do café da manhã, almoço e jantar.

2. Cápsulas de Domperidona

Domperidona	10mg	- Procinético.
-------------	------	----------------

Mande (x) cápsulas.

Tomar 1 a 2 cápsulas 3 a 4 vezes ao dia.

3. Cápsulas de Pascolique

Pascolique	100mg	- Antiespasmódico, adsorvente gastrointestinal.
------------	-------	---

Mande (x) cápsulas.

Tomar 1 cápsula 3 vezes ao dia.

4. Suspensão de Pascolique

Pascolique	100mg	- Antiespasmódico, adsorvente gastrointestinal.
Suspensão base qsp	5ml	- Veículo.

Mande (x) ml.

Tomar 5ml 3 vezes ao dia.

Estas informações devem ser analisadas pelo profissional prescritor antes de adotados na clínica, e são de distribuição e uso exclusivo de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários devidamente inscritos em seus C.R.s.

GV – Consultoria Farmacêutica

www.consultoriafarmaceutica.com.br



5. Cápsulas de Pantoprazol

Pantoprazol	20mg	-Antiulceroso/ Inibe a bomba protônica.
-------------	------	---

Mande (x) cápsulas.

Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições.

6. Cápsulas de Omeprazol

Omeprazol	20mg	-Antiulceroso/ Inibe a bomba protônica.
-----------	------	---

Mande (x) cápsulas.

Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia, 30 minutos antes das refeições.

7. Cápsulas de Metoclopramida

Metoclopramida	10mg	- Antiemético.
----------------	------	----------------

Mande (x) cápsulas.

Tomar 1 a 2 cápsulas 2 a 3 vezes ao dia.

8. Cápsulas de Pancreatina

Pancreatina	50mg	- Enzima digestiva.
-------------	------	---------------------

Mande (x) cápsulas.

Tomar 1 a 2 cápsulas às refeições.

Contra-indicação ⁽³⁾

- ✓ Hipersensibilidade ao LANSOPRAZOL e BROMOPRIDA;
- ✓ Hemorragias gastrintestinais;
- ✓ Obstrução mecânica da motricidade gastrintestinal;
- ✓ Gravidez e lactação;
- ✓ Disfunção hepática.

Referências Bibliográficas

1. Carlsburg, R., Fischer, M.. [Treatment of upper-abdominal pain in chronic gastritis. Results of therapy with the motility regulating drug Bromopride][Article in German] Fortschr Med. 1980 May 8;98(17):(679-82).
2. Baldi, F., Morselli-Labate, A.M., Cappiello, R., Ghersi, S.; Italian Lansoprazole Study Group. Daily low-dose versus alternate day full-dose lansoprazole in the maintenance treatment of reflux esophagitis. Department of Gastroenterology, S. Orsola Hospital, Bologna, Italy. Am J Gastroenterol. 2002 Jun;97(6):1357-64.
3. Korolkovas ^a, Dicionário Terapêutico Guanabara, Edição 2000/2001. Editora Guanabara Koogan
4. <http://www.farmaceticovirtual.com.br/html/defpage.htm>
5. Fonte: Folha de São Paulo-SP 31/07/2003
6. Laboratórios Medley